

**VI. PATHOLOGIES DE LA
BOULE DE BICHAT**

A. LA LIPODYSTROPHIE (LP)

Depuis 1997, il a été décrit chez certains patients (50 à 65% selon les études) HIV-1 positifs, sous thérapie antirétrovirale hautement active depuis plus d'un an, un syndrome lipodystrophique. Ce syndrome associe aussi bien des signes biologiques que des signes cliniques avec en particulier un émaciement de la face dû à une atrophie des plans graisseux sous cutanés. Cette pathologie nous intéresse car elle constitue un bon exemple de persistance de la boule de Bichat dans une pathologie qui touche par ailleurs le tissu adipeux.

1-DESCRIPTION DU SYNDROME LIPODYSTROPHIQUE

1. Les signes cliniques et biologiques

- **Perte de graisse**
 - Face (fig. 20, 21, 22)
 - atrophie du tissu adipeux sous cutané
 - tempes creusées
 - orbites enfoncées
 - arcades zygomatiques proéminentes
 - Membres
 - maigreur
 - survisualisation d'un réseau veineux non variqueux
 - survisualisation musculaire et osseuse
 - Fesses
 - diminution du pli cutané
 - survisualisation musculaire
 - perte des contours
- **Accumulation de graisse:**

Concerne cinq localisations:

 - augmentation du tour de taille
 - gynécomastie
 - bosse de Bison
 - lipomes
 - accumulation de graisse cervicale